

## Mehlwurmfütterung

- Mehlwürmer halbieren
- Tier in die Hand nehmen, die Hand muss alle Körperteile (auch Bruchgelenke) umschließen
- „Mehlwurmpampe“ vorsichtig ums Maul schmieren (nicht in die Nase!!!!) oder ins Maul schieben. Meist schleckt das Tier die Innereien heraus, evtl. frisst es auch gleich den ganzen Wurm
- Wiederholen

Kleine Fledermäuse (Zwergfl., Mückenfl., Kleine Bartfl.) brauchen am 1. Abend etwa die Pampe von 6-10 Mehlwürmern.

Größeren Arten ( z.B. Abendsegler, Zweifarbfledermäuse, Langohren, Breitflügelfledermaus) bis zu 20/30. Die fressen aber meistens nach dem 2.-5. halbierten Mehlwurm die restlichen Teile mit etwas nachschieben ohne Probleme. Sollten die Tier Durchfall bekommen/haben, vor dem Füttern, die ersten 1-3 Tage etwas Naturjoghurt ins Maul schmieren. Mehlwürmer sind für manchen Fledermausdarm gewöhnungsbedürftig, das bedeutet Durchfall. Sollte der Durchfall mehr als 3 Tage andauern, das Tier trotz gutem Fressen nicht zunehmen, sollte der Kot auf Parasiten: Bandwürmer oder Nematoden untersucht (Tierarzt) werden.

Diese Fütteraktionen müssen so lange wiederholt werden bis das Tier alleine fressen kann und die Futterschale findet. Bis die kleinen Fledermäuse lernen ganze Mehlwürmer zu fressen kann es eine Woche dauern.

## 5. Medikamente die fledermaustauglich sind:

Desinfektion Wunden: Alkohol, Kamillosan (Waschlösung) Betaisadona-Salbe

Verdauung: Kamillentee, Naturjoghurt, Darmgel

Flughautwunden sowie Augenentzündungen: Regepithel-Augensalbe (Alcon)

Pilzbefall: Imaverol-Lösung

Als Antibiotika oral: Vibramycin-Saft (bitte nur in Absprache mit dem Tierarzt verwenden, man sollte daran denken, dass dir Tiere wieder in die Natur und diese nicht unnötig belasten sollen!)

Als Antibiotika lokal: Nebacitin (Puder, Salbe)

Zur Stärkung: Vitaminpaste (Zoogeschäft) z.B. Nutical....

Zur Entfernung von Klebteilen und gegen trockene Flughaut: Oliven

Viel Erfolg ihr Flederhaus

©Ingrid Kaipf 2001